

MULIGE KOMPLIKASJONER

Skader på spiserøret, magesekken eller tolvfingertarmen av selve instrumentet skjer neste aldri. Faren for komplikasjoner er størst når det blir utført terapeutiske prosedyrer, som for eksempel fjerning av polypper. Observasjon 1-2 timer etter prosedyre er da vanlig.

Hvis du i løpet av de første 3 døgn etter prosedyren får magesmerter som øker på, eller tegn til pågående blødning (bekfarga, svart avføring eller blodig oppkast): Ta snarlig kontakt med lege her ved Ålesund Mage Tarm Klinikk tlf 90 22 55 52 kl.07.30-15.30, eller med legevakt etter ordinær arbeidstid, tlf 116117.

RESULTATET AV UNDERSØKELSEN

Resultatet av undersøkelsen og forslag til videre utredning og behandling får du vite med en gang. Legen som undersøker deg sender også brev til fastlegen din, hvor resultatet av undersøkelsen sammenfattes. Når det tas vevsprøver eller fjernes polypper vil disse bli sendt til patolog for mikroskopisk undersøkelse. Det tar da vanligvis 1 – 2 uker før prøvesvar foreligger. Dette prøvesvaret vil bli sendt til fastlegen din.

Ålesund Mage Tarm Klinikk

er en klinikk for endoskopi og utredning av mage- og tarm plager.

Våre leger har driftsavtale tilknyttet Helse Midt Norge.

Våre to ansatte leger er spesialutdannet i indremedisin og fordøyelsessykdommer.

VÅRT KONTOR FINNER DU I

DAASKOGEN NÆRINGSBYGG (MOA)

**LANGELANDSVEIEN 17,
6010 ÅLESUND
TLF; 90225552**

**HJEMMESIDE:
ALESUNDMAGETARM.NO**




Til deg som skal til gastroskopi

- Les all informasjon nøye

Faste fra kvelden før (du kan drikke klar væske inntil 4 timer før undersøkelsen)

- Blodtynnende medisiner
- Syrehemming



VELKOMMEN TIL OSS

Med gastroskopi blir spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen undersøkt. Utstyret ser ut som en slange, omtrent like tykk som en lillefinger, og inneholder et videokamera.

Ved denne undersøkelsen kan sykdommer som f eks betennelse, sår og kreft påvises. Gjennom endoskopet kan det tas vevsprøver og utføre enkle terapeutiske inngrep, først og fremst fjerning av polyper.

FORBEREDELSE ER SVÆRT VIKTIG!

1) FASTE:

Før gastroskopi må magesekken være tom, derfor må du ikke spise fast føde etter kl 24 kvelden før undersøkelsen og ikke drikke klare væsker de siste 4 timer før. Du kan skylle munnen.

2) BLODTYNNENDE BEHANDLING

Viss du bruker blodtynnende legemidler av type Marevan, Xarelto, Pradaxa, Lixiana eller Eliquis, bør du om mulig slutte å ta tablettene 2 dager før undersøkelsen. Forhør deg med fastlegen hvis du er i tvil om det er forsvarlig, eller hvis du har andre sykdommer som du tror kan være til hinder for å gjennomføre forberedelsene eller undersøkelsen, f. eks alvorlig hjertesvikt, alvorlig nyresvikt, svært ustabil blodtrykk eller svært ustabil diabetes.

Bruker du det blodtynnende medikamentet Marevan, skal du ta INR hos fastlege dagen før undersøkelsen og ha med deg prøvesvar. Det er ikke nødvendig å stoppe Albyl E eller Plavix

3) SYREHEMMENDE MEDISIN:

Dersom ikke annet står i innkallingsbrevet skal du: 14 dager før gastroskopi stoppe all syrehemmende medisin (som f eks Ranitidin, Nexium, Somac) Hvis du har kjent reflukssykdom kan du benytte reseptfrie syrenøytraliserende (Link, Balancid)

Andre SPESIELLE HENSYN: Se neste side**

SPESIELLE HENSYN

4) Har vært på sjukehus/hos lege i land utenfor Norden siste 12 måneder: **Kontakt fastlege** minst 1 uke før undersøkelsen, for å få tatt prøver for å utelukke antibiotikaresistente bakterier (MRSA,VRE,ESBL)

5) MEDIKAMENTER:

Om du bruker viktige medisiner om morgenen (f eks hjerte-, lunge-, immunhemmende medisin) skal du ta disse sammen med vann slik du ellers pleier å gjøre

Om du har diabetes: Ta ikke morgenmedisin (Insulin eller diabetestabletter) før undersøkelsen er utført. Ta med deg mat slik at du har noe å spise 1 time etter undersøkelsen

SELVE UNDERSØKELSEN

Du får en lokalspray bak i svelget, det er sjelden nødvendig med annen medisinerings før undersøkelsen. Tannprotese må tas ut. Du får en plast-ring mellom tennene, slik at du ikke biter på utstyret.

Din oppgave er å puste rolig og avslappet. Undersøkelsen tar omtrent 5 minutter.

Hvis du på forhånd tror du trenger avslappende eller smertestillende medisin intravenøst må du ha med deg ledsager som kan følge deg hjem. Du kan da ikke kjøre bil før tidligst neste dag, og må derfor ha med egen sjåfør eller ta drosje hjem fra undersøkelsen.

HVA SKJER ETTERPÅ?

Du skal ikke spise eller drikke i 1 time etter undersøkelsen (pga lokalbedøvelsen i svelget)

Vanligvis reiser du fra klinikken rett etter undersøkelsen. Men hvis du har fått intravenøs medisin eller hvis det er utført terapi (polypfjerning), må du være igjen for observasjon i 1-2 timer.

Etter undersøkelsen vil det være noe luft igjen i magesekken og i tarmene dine, derfor kan du kjenne deg litt oppblåst eller få litt mageknip etter undersøkelsen

Sårhetsfølelse i halsen de første dagene etter undersøkelsen er normalt.